



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E ARSIMIT
SPORTIT DHE RINISË
QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE

PROVIMI I MATURËS SHTETËRORE 2018

SESIONI I

VARIANTI A

E mërkurë, 13 qershor 2018

Ora 10.00

Lënda: MATEMATIKË (GJIMNAZI)

ZGJIDHJE

1. Përgjigjet për pyetjet 1-13.

Pyetja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Alternativa e saktë	B	A	D	B	D	C	D	D	C	C	B	C	D

2. Një mënyrë zgjidhje për pyetjet 14-25

14.

3 pikë

$$E = \{x \in \mathbb{R} / x+1 > 0 \text{ dhe } 3-x \neq 0\}$$

$$K_1 : x+1 > 0 \Rightarrow x > -1$$

$$E_1 =]-1; +\infty[$$

$$K_2 : 3-x \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$$

$$E_2 = \mathbb{R} - \{3\}$$

$$B.p : E = E_1 \cap E_2$$

$$E =]-1; 3[\cup]3; +\infty[$$

15.

3 pikë

Që funksioni të jetë i vazhdueshëm në $x=0$, duhet të plotësohen njëherazi 3 kushte:

1) $f(0) = A + 2$

2) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} 3 \cdot \frac{\sin 3x}{3x} = 3$

$$\lim_{x \rightarrow 0} 3x = 0 \text{ dhe } \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \rightarrow \frac{0}{0} \text{ f.p.}$$

3) Që funksioni të jetë i vazhduar në $x=0 \Leftrightarrow$ që $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \Rightarrow 3 = A + 2 \Rightarrow A = 1$

Përgjigje: Për $A=1$ funksioni është i vazhdueshëm në $x=0$

16.

3 pikë

$$\text{Kemi: } \begin{cases} k_{tg} = f'(1) \\ k_{tg} = \tan 45^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \left(\frac{x-a}{2x} \right)'_{x=1} = 1$$

$$\text{Së pari: } y' = \frac{(x-a)' \cdot 2x - (2x)' \cdot (x-a)}{(2x)^2} = \frac{2a}{4x^2}$$

$$\text{Së dyti: } \left(\frac{2a}{4x^2} \right)'_{x=1} = 1 \Rightarrow a = 2$$

17.

2 pikë

$$n(H) = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$

$$A = \{SST; STS; TSS\} \Rightarrow n(A) = 3$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(H)} = \frac{3}{8}$$

18.

$$\text{a) } \begin{cases} y = 1 - x^2 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow 1 - x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$$

Pikat ku grafiku pret boshtin OX janë: $(-1;0)$ dhe $(1;0)$

b) Skicojmë grafikët e funksioneve mbi të njëjtin sistem koordinativ:


$y = 1 - x^2$ parabolë me kulm $K(0;1)$

$y = -3$ drejtëz paralele me (OX)

Kufijtë e integritit: $y = 1 - x^2$ dhe $y = -3 \Rightarrow 1 - x^2 = -3 \Rightarrow x = \pm 2$

Meqenëse dy funksionet janë funksione çift atëherë:

$$S = 2 \int_0^2 [1 - x^2 - (-3)] dx = 2 \int_0^2 (4 - x^2) dx = 2 \left(4x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^2 = 2 \left(8 - \frac{8}{3} \right) = \frac{32}{3} \text{ njësi katrore.}$$



19.

3 pikë

Së pari:

$$\text{Gjejmë mjedisin E: } x^2 - 9 \geq 0 \Rightarrow x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x = \pm 3$$

$$E =]-\infty; -3] \cup [3; +\infty[$$

Së dyti:

Evidentojmë zgjidhjet e ekuacionit në E:

$$3x - 6 = 0 \Leftrightarrow 3x = 6 \Leftrightarrow x = 2 \notin E$$

$$\text{ose } \sqrt{x^2 - 9} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 9 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 3 \in E$$

•Zgjidhje e ekuacionit është bashkësia: $\{-3; 3\}$

x	$-\infty$	-3	+3	$+\infty$	
x^2-9	+	0	-	0	+
I_n		✓	✓	✓	✓

20.

4 pikë

Për të studiuar monotoninë e funksionit, studiojmë shenjën e derivatit

të parë për cdo $x \in \mathbb{R}$. $f'(x) = 3x^2 - 6x$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 6x = 0 \Rightarrow 3x(x-2) = 0 \Rightarrow 3x = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ose } x-2 = 0 \Rightarrow x = 2$$

Në intervalet $]-\infty; 0[$ dhe $]2; +\infty[$ funksioni është rritës.

Në intervalin $]0; 2[$ funksioni është zbritës.

$$y_{\max} = f(0) = 5 \Rightarrow (0; 5) \text{ maksimumi.}$$

$$y_{\min} = f(2) = 1 \Rightarrow (2; 1) \text{ minimumi.}$$

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y					

max min

21.

2 pikë

$$(AB): \frac{x-1}{3-1} = \frac{y-2}{4-2}$$

$$(AB): \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{2} \Rightarrow x-1 = y-2 \Leftrightarrow x-y+1=0$$

Meqënëse, $C \in (AB) \Rightarrow$ koordinatat e C e vërtetojnë ekuacionin e (AB) $\Rightarrow a-0+1=0 \Rightarrow a=-1$

22.

a) Në skajin e boshtit të madh: $(a;0)=(2;0) \Rightarrow a=2$

1 pikë

b) $(t_{gj}) \perp (d) \Rightarrow k_{t_{gj}} \cdot k_d = -1$ Por $k_d = -1 \Rightarrow k_{t_{gj}} = 1$

3 pikë

Ekuacioni i tangjentes ka trajtën: $y = x + t$

Nga kushti i tangjencës së drejtëzës me elipsin kemi: $a^2 k^2 + b^2 = t^2 \Rightarrow t = \pm \sqrt{13}$

Ekuacionet e tangjenteve janë: $y = x + \sqrt{13}$ dhe $y = x - \sqrt{13}$

23.

2 pikë

$$m = \frac{4 \cdot 4 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 5 + 7 \cdot 5 + 8 \cdot 4 + 9 \cdot 4 + 10 \cdot 2}{4 + 6 + 5 + 5 + 4 + 4 + 2} = \frac{199}{30} = 6.6$$

Notë më të lartë se 6.6 kanë 15 nxënës të cilët përbëjnë 50% të klasës.

24.

3 pikë

Ndërtojmë lartësinë $[SH_1]$ të faqes SBC. Kemi:

$$[SO] \perp ABC$$

$$[SH_1] \perp [BC] \subset ABC$$

Ku $[OH_1]$ është projektion kënddrejtë i $[SH_1]$ në (ABC)

\Rightarrow Teorema e 3 $\perp \Rightarrow [OH_1] \perp [BC]$


U krijua këndi i prerjes së drejtë (SH_1O) .

Në të njëjtën mënyrë në dyfaqëshat e tjerë krijohen prerjet \hat{SH}_2O dhe \hat{SH}_3O .

Nga kongruenca e trekëndëshave $SOH_1; SOH_2; SOH_3 \Rightarrow [OH_1] = [OH_2] = [OH_3]$

dhe $[OH_1] \perp [BC]; [OH_2] \perp [AB]; [OH_3] \perp [AC] \Rightarrow$

$\Rightarrow O$ është qendra e rrethit brendashkruar bazës.



25.

4 pikë

$$\text{Gjejmë: } f[g(x)] = 2^{x^2} \rightarrow x \in \mathbb{R} \text{ dhe } g[f(x)] = 2^{2x} \rightarrow x \in \mathbb{R}$$

$$\text{Krijohet ekuacioni: } f[g(x)] = g[f(x)] \Rightarrow 2^{x^2} = 2^{2x} \Leftrightarrow x^2 = 2x$$

$$\Rightarrow x = 0 \text{ ose } x = 2$$

• Bashkësia e zgjidhjeve është: $\{0; 2\}$.